

Europe-Pharm



Se tillgängliga
DOSERING och PAKET

[Våra prislista](#)

Bipacksedel: Information till användaren
Sibutramin (Slimex 15 mg hårda kapslar)
sibutramin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller ditt apotek.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är sibutramin och vad används det för?
2. Innan du använder sibutramin
3. Hur du använder sibutramin
4. Eventuella biverkningar

Vad innehåller sibutramin?

1 kapsel innehåller: Sibutraminhydrokloridmonohydrat 10 mg respektive 15 mg.

Övrigt: Laktosmonohydrat 212 mg respektive 207 mg, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, indigokarmin (E 132), titandioxid (E 171), gelatin, natriumlaurylsulfat, dimetikon, järnoxid och järnhydroxider (E 172), shellack, sojalecitin (E322), sibutramin, innehåller dessutom kinolingult (E 104).

1. VAD ÄR SIBUTRAMIN OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Sibutramin är ett läkemedel mot fetma som bör användas i kombination med ett viktbehandlingsprogram bestående av kost- och livsstilsförändringar samt ökad fysisk aktivitet. Sibutramin ger en ökad mättnadskänsla samt dämpar den minskning av energiförbrukning som annars ses vid viktminskning.

Läkemedlets utseende:

15 mg: Kapsel, hård med blå överdel och vit underdel

2. INNAN DU ANVÄNDER SIBUTRAMIN

Använd inte SIBUTRAMIN:

- om du är överkänslig mot sibutramin eller mot något av övriga innehållsämnen i produkten.
- om din övervikt är orsakad av sjukdom eller om du har allvarliga ätstörningar.
- vid vissa psykiska sjukdomar (t ex mano-depressiv sjukdom) eller Gilles de la Tourette's syndrom.
- vid samtidig användning, eller användning under de senaste två veckorna av MAO-hämmare (monoaminooxidashämmare) eller andra centralt verkande läkemedel mot psykiatrisk sjukdom eller övervikt samt läkemedel innehållande tryptofan (mot sömnstörningar).
- vid vissa hjärtsjukdomar eller obehandlat förhöjt blodtryck.
- vid hypertyreoidism (förhöjd funktion av sköldkörteln) eller allvarligt nedsatt lever- eller njurfunktion.

- vid prostatabesvär med problem att kasta vatten, eller vid överfunktion hos binjuremärgen (feokromocytom) eller vid glaukom (trång ögonkammavinkel).
- vid missbruk av droger, läkemedel eller alkohol.
- vid graviditet och amning.
- om du är under 18 år eller över 65 år.

Försiktighet:

Blodtryck och hjärtfrekvens ska kontrolleras under behandling med sibutramin. Detta görs normalt var 14:e dag under de tre första månaderna, därefter regelbundet.

Om du tidigare har lidit av depression, du har epilepsi, mild till måttligt nedsatt njur- eller leverfunktion eller ofrivilliga ryckningar i ansiktet (s k tics) bör du rådgöra med din läkare innan behandling påbörjas. Om du får andningssvårigheter, bröstsmärtor och/eller svullna anklar under behandlingen med sibutramin bör du snarast kontakta din läkare. Kvinnor i fertil ålder ska använda adekvat preventivmedel vid behandling med sibutramin. Om du har ökad blödningsbenägenhet och/eller tar läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga så ska sibutramin användas med försiktighet.

Sibutramin innehåller laktos och skall därför inte användas om du har någon av följande ovanliga ärftliga sjukdomar: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Sibutramin ska därför inte användas under graviditet. Kvinnor i fertil ålder ska använda preventivmedel vid behandling med sibutramin.

Amning

Det är okänt om sibutramin passerar över i modersmjölk. Sibutramin ska därför ej användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel, på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av andra läkemedel:

Behandlingseffekten kan påverkas om sibutramin tas samtidigt med vissa andra läkemedel, t ex vissa medel mot svamp- och bakteriell infektion och vissa medel mot epilepsi. Behandlingseffekten kan även påverkas vid samtidig användning av vissa läkemedel mot migrän, opioider (morfinliknande preparat), serotoninhöjande läkemedel (s.k. SSRI som används mot t ex depression), preparat som kan höja blodtrycket eller hjärtfrekvensen (t ex vissa läkemedel mot hosta, förkylning och allergier) samt vissa slemhinneavsvällande läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

3. HUR DU ANVÄNDER SIBUTRAMIN

Använd alltid sibutramin enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller ditt apotek om du är osäker. Vanlig dos är 1 kapsel 1 gång per dag som intages på morgonen. Kapseln sväljes hel med ett glas vatten, med eller utan mat.

Om du upplever att du inte får tillräcklig effekt (dvs viktninskning mindre än 2 kg inom 4 veckor) bör du diskutera detta med din läkare.

Om du tagit mer sibutramin än vad du borde:

Symptom på överdosering kan vara hjärtklappning. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare eller sjukhus.

Om du glömt att ta sibutramin:

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan sibutramin ge biverkningar. De flesta biverkningar inträffar i början av behandlingen (under de 4 första veckorna) och avtar med tiden.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Förstoppning, muntorrhet samt sömnsvårigheter.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Hjärtklappning, förhöjt blodtryck, blodvallningar, illamående, yrsel, försämring av eventuella hemorrojder, onormala känsel­fö­r­nimmelser (myrkrypningar, stickningar), huvudvärk, oro, svettningar samt förändrad smakupplevelse.

Mindre vanliga/sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Rastlöshet, nedstämdhet, tillfällig störning i närminnet, muskelkramper, dimsyn, diarré, kräkning, håravfall, lever- och njurpåverkan, svårigheter att tömma urinblåsan. Förändrad ejakulering/orgasm, impotens, oregelbunden menstruation och menstruella förändringar.

Blodbildsförändringar, hjärtflimmer, milda till allvarliga allergiska reaktioner från klåda och nässel­feber till svullnader och anafylaktisk chock.

Sluta att ta sibutramin och kontakta omedelbart din läkare om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller svalg eller nässelutslag, andnöd och svårighet att svälja inträffar. I sällsynta fall har huvudvärk och ökad aptit noterats då behandlingen avslutas.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare.